



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Nasz znak 2223/ZP/5063

Sokołów Podlaski 02.01.2012 r.

Pytania i Odpowiedzi

Dotyczy: Systematycznej dostawy produktów farmaceutycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim nr ogłoszenia 405902-2011

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z następującym pytaniem:

Zwracamy się z zapytaniem *dotyczy zadanie 5, pozycja 161*

1. Czy Zamawiający wymaga, aby preparat Imipenemum + Cilastatinum /Tienam /, posiadał zarejestrowane wskazania do stosowania m.in.:
 - zakażeniach śródporodowych i poporodowych;
 - w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie wywołana zakażeniem bakteryjnym;
 - w leczeniu pacjentów z bakteriami, która przebiega w powiązaniu z: a) powikłanymi zakażeniami w obrębie jamy brzusznej; b) ciężkim zapaleniem płuc, w tym szpitalnym i zapaleniem płuc związanym ze stosowaniem respiratora; c) zakażeniami śródporodowymi i poporodowymi; d) powikłanymi zakażeniami układu moczowego; e) powikłanymi zakażeniami skóry i tkanek miękkich lub f) neutropenią połączoną z wystąpieniem gorączki prawdopodobnie wywołanej zakażeniem bakteryjnym; lub gdy podejrzewa się, że bakteriami przebiega w powiązaniu z w/w zakażeniami?

ODPOWIEDŹ: Wskazania do stosowania podano w SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby preparat Imipenemum + Cilastatinum /Tienam /, był zarejestrowany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i starszych?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga, aby preparat Imipenemum + Cilastatinum /Tienam /, był zarejestrowany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i starszych.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby gwarantowany okres przydatności do użycia rozpuszczonego preparatu Imipenemum + Cilastatinum /Tienam /, wynosił co najmniej dwie godziny?

ODPOWIEDŹ: Przygotowany roztwór powinien zachować swoje właściwości przez 4 godz. w temp. 25° lub przez 24 godz. w lodówce (2°-8°C).

4. Czy Zamawiający wymaga, aby do przygotowania roztworu preparatu Imipenemum + Cilastatinum /Tienam /, jako roztwór do infuzji, mógł być stosowany m.in. 5% roztwór glukozy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga, aby do przygotowania roztworu preparatu Imipenemum + Cilastatinum /Tienam /, jako roztwór do infuzji, mógł być stosowany m.in. 5% roztwór glukozy.

Zwracamy się z zapytaniem dotyczy zadania 7

5. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj.

- w pozycji 2, 4, 5, 6, 7, w opakowaniach x 90 tabl. zamiast 30 tabl.;

- w pozycji 1,8 w opakowaniach x 90 tabl. zamiast 60 tabl.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na inne wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do całych opakowań leków.